



Alta Endoscopia (EGD) or ERCP Preparacion

(Instructions for Upper EGD or ERCP)

Nombre: _____ Fecha de Nacimiento: _____

Fecha del Procedimiento: _____ Hora de Llegada: _____ Medico: _____

- Oficinas: MidAtlantic Endoscopy Center-Lancaster (2104) Lancaster General Hospital Ephrata Community Hospital
 MidAtlantic Endoscopy Center-Oregon Pike Lancaster Regional Medical Center
 Lancaster Gastroenterology Procedure Center (2112) Heart of Lancaster Regional Medical Center

INSTRUCCIONES:

1. A menos que esté mandado de otra manera, tome todas sus medicaciones rutinarias, incluyendo aspirina y Plavix hasta la medianoche el día antes de procedimiento, nada de comer o beber después de la medianoche.
2. No se debe masticar chicle o dulce la mañana de la endoscopia ya que esto demorarán su procedimiento.
3. **PARAR** ADVIL, MOTRIN, ALEVE, IBUPROFEN, MULTI-VITAMINS, VITAMINA E, ACEITE DE PESCADO, FLAXSEED y HIERRO cinco (5) días antes de su procedimiento. **Toma Tylenol solamente para el dolor. Coumadin, Aggrenox y Ticlid deben NO tomarse por cinco (5) días antes de procedimiento.**

Instrucciones especiales de su medicamentos: _____

4. Aguanta todos los medicamentos para la diabetes hasta después de procedimiento.

Por favor haga arreglos para que alguien lo triage y lo lleve a la casa. El conductor debe permanecer en nuestras instalaciones todo el tiempo – aprox. 2 horas.

**Por favor notifica nosotros inmediatamente si algunos cambios en su seguro, por que puede ser castigo en pagar de su bolsillo.

Si tiene preguntas sobre esta preparación, llame Regional GI en 717-869-4600.

Firma del paciente: _____ Fecha: _____

Firma del testigo: _____ Fecha: _____